

GLOBAFIX PLUS

Sredstvo za vezivanje mikotoksina premijum kvaliteta za upotrebu u stočnoj hrani

Savremen program kontrole mikotoksina efikasan u vezivanju širokog spektra mikotoksina, naučno dokazan u in vivo i in vitro uslovima.

Dodatno na sposobnost vezivanja uobičajenih mikotoksina (aflatoksini, trihoteceni), Globafix Plus je formulisan za kontrolu složenijih mikotoksina kao što su Fuzarijum mikotoksini Vomitoxin (DON), zearalenoni (ZEA), i fumozini.

Globafix Plus je složeno sredstvo za vezivanje mikotoksina, sačinjeno od tri komponente sinergističkog dejstva

Komponente Globafix Plus proizvoda su:

- Magnezijumom bogat montmorilonit (HSCAS) izabran zbog efikasnosti na širok spektar mikotoksina
- Odabrane ćelije zida kvasca bogate beta glukanim sa izuzetnim afinitetom za vezivanje mikotoksina, posebno zearalenona i ohratoksina
- Pirolizovani prirodni ugalj ne vezuje hranljive materije, snažan adsorbent endotoksina i fuzarijum mikotoksina



Druge prednosti i benefiti:


• Zaštita creva:

Globafix Plus obnavlja i ojačava zidove creva, zatvara sitne čvoriće i pospešuje crevne protiv upalne aktivnosti što pomaže u blokiranju prodiranja mikotoksina

• Imunostimulacija:

Zahvaljujući visokom sadržaju beta glukana u ćelijama zida kvasca, Globafix Plus povećava imuno stimulaciju, ograničavajući na taj način imunosupresivan efekat mikotoksinskih toksikoz

Globafix Plus unapređuje zdravlje, rezultate rasta i produktivnosti (prirast, stopa nosivosti, reprodukcija i sl.) nezavisno od kvaliteta hrane i prisutnosti mikotoksina.




GLOBALFIX PLUS

Sredstvo za vezivanje mikotoksina premijum kvaliteta za upotrebu u stočnoj hrani

Šta ga čini jedinstvenim?

- Širok spektar dejstva i efikasnost protiv svih uobičajenih i ekonomski važnih mikotoksina, posebno teško vezujuće kao što su vomitoksin (DON), zearalenoni (ZEA), i fumozini.


Efikasnost vezivanja Zearalenona (ZEA) i Vomitoksina (DON)



Istraživanje Dr. Monika Sabater - PhD projekat (2003)
Univerzitet Utrehta - Veterinarski fakultet - odsek za toksikologiju


- Dokazana efikasnost vezivanja in vivo

Rezultati Globafix Plus-a kod prasadi Screening Test koncentracije DON-a u krvi (HOBUIWT Projekat 2004)



10 PRASADI: 5x2: Kontrola nekontaminirane hrane = 181 ppb DON * 28,5 ppb ZEA;
Kontaminirana hrana = 1600 ppb DON + 800 ppb ZEA; Globafix 1,5 kg/ toni.
G. Haesaert, D. Fremaut, G. Vlaemynck, P. Maene, S. Isebaert, R. De Vreese (GENT - Belgija)


Rezultati Globafix Plus-a kod prasadi Screening Test koncentracije Zea u krvi (HOBUIWT Projekat 2004)



10 PRASADI: 5x2: Kontrola nekontaminirane hrane = 181 ppb DON * 28,5 ppb ZEA;
Kontaminirana hrana = 1600 ppb DON + 800 ppb ZEA; Globafix 1,5 kg/ toni.
G. Haesaert, D. Fremaut, G. Vlaemynck, P. Maene, S. Isebaert, R. De Vreese (GENT - Belgija)

- Ne vezuje hranljive materije, nema sporednih efekata

Rezultati prasadi sa Globafix Plus-om i hranom kontaminiranom sa DON i FUMONIZIN toksinima



Nivo kontaminacije: 2000 ppb DON - 50 ppm Fumonizin
u kontaminiranom kukuruzu (2930 DON + 605 ZEA+)
(85 DON + 181 ZEA + 92775 FB1 + 25275 FB2)

Preporučeno doziranje:

1-3 kg/ MT gotove hrane
ZEA > 500 ppb: 1,0 kg/to
DON > 2500 ppb: 2,0 - 3,0 kg/to



Pažnja:

- Za dodatne informacije, obratite se lokalnom predstavniku kompanije Global Nutritional International